

梅毒

梅毒是一种通过阴道性交、肛交和口交传播的细菌性感染。它还可以由妊娠妇女在怀孕期间传染给宝宝。如果口腔或嘴唇上有梅毒疮口，则梅毒可以通过亲吻传播。

症状

大部分患有梅毒的人群从未注意到任何症状。症状包括：

- 在性交期间，暴露在外的皮肤（生殖器、肛门、口腔）上可能会生长被称之为下疳的无痛疮口
- 皮疹，特别是在手掌或脚掌上
- 局部区域脱发、发烧、淋巴腺体肿胀、体重减少、肌肉疼痛和疲劳



梅毒



预防

避孕套和牙齿隔离障可以预防梅毒的传播，但仅限于它们遮盖下疳（疮口）的情况下。拥有多名伴侣会增加您感染或传播性传播感染(STI)的风险，包括梅毒。

检测

您的医疗保健提供者将通过血样检测梅毒。

治疗

梅毒的症状最终会在治疗或不治疗时消除，但未经治疗时，感染仍旧存留在体内，可能会持续造成伤害。

梅毒的最佳治疗方式是注射抗生素。您的医疗保健提供者将负责注射至少一剂药（有时可能会注射高达三剂药）。需要进行全面治疗以清除感染，因此完成治疗是尤为重要的。您应在三个月后进行复查，确保感染已被清除。

治疗理由

若不治疗，梅毒会一直存留在体内。即使症状消除，梅毒仍旧可以危害您的心脏、大脑和神经系统，并最终导致死亡。

患有梅毒还更易染上或传播 HIV。

性伴侣

您的性伴侣也需得到治疗，以确保他们不会患上严重疾病，再次传染您或他人。您应当将您的感染情况告知过去3至12个月间的所有性伴侣，使其能够接受检查。您的医疗保健提供者将帮您决定您应当联络哪些伴侣。

梅毒和妊娠

所有妊娠人员应当在孕期尽早检测是否患有梅毒和其他STI，包括HIV。患有梅毒的妊娠人员可在孕期将感染传给宝宝。这被称为胎传梅毒。胎传梅毒可引发死胎、早产、婴儿出生时体重过低，或在出生不久后死亡。

纽约市性健康诊所提供机密且免费或廉价服务，包括STI和HIV检测。

如需查找一家诊所，请访问：
nyc.gov/health/clinics。